

## Kjente bivirkninger ved bruk av dekstroamfetamin

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Slutt å ta studiemedisin og kontakt med din behandler eller legevakt umiddelbart hvis du opplever følgende symptomer: hallusinasjoner, psykose/psykotiske reaksjoner, selvmordsatferd (svært sjelden: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer); alvorlige allergiske reaksjoner som forårsaker hevelse i ansikt, tunge eller hals som svelgevansker, elveblest og pustevansker (angioødem/anafylaksi); unormal muskelnedbrytning med symptomer som uforklarlige muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvakhet.

**Svært vanlige** (mer enn 1 av 10 personer): redusert appetitt, redusert vektøkning og vekttap, problemer med å sove, nervøsitet.

**Vanlige** (opptil 1 av 10 personer): uregelmessig eller økt puls, mer fremtredende puls, magesmerter og/eller -kramper, kvalme, oppkast, tørr munn, endringer i blodtrykk og hjertefrekvens, leddsmerter, svimmelhetsfølelse, rykkvise eller ufrivillige bevegelser, hodepine, hyperaktivitet, unormal atferd, aggressivitet, opphisselse, anoreksi, angst, depresjon, irritabilitet.

**Sjeldne** (opptil 1 av 1 000 personer): angina pectoris, vanskeligheter med synsskarphet og fokusering, uklart syn, utvidelse av pupillene, utmattelse, utslett, elveblest.

**Svært sjeldne** (opptil 1 av 10 000 personer): reduksjon i antall røde blodceller, noe som kan gjøre huden blek og føre til svakhet eller kortpustethet, endringer i blodcelletelling, hjertestans, Tourettes syndrom, unormal leverfunksjon, muskelkramper, kramper, ufrivillige bevegelser, blødning inne i hodeskallen, selvmordsatferd eller selvmord, tics, forverring av pre-eksisterende tics, kløende røde hudlesjoner eller flekker med flassende hud, inflammasjon i blodkarene i ryggmargen og hjernen.

**Ikke kjent frekvens:** hjertemuskelsykdom, hjerteinfarkt, inflammasjon i deler av tykktarmen, diaré, brystmerter, vekstretardasjon ved langvarig bruk, økt kroppstemperatur, allergiske reaksjoner, plutselig død, forstyrrelser i syre-base-balansen i kroppen, vanskeligheter med å kontrollere bevegelser, unormal eller svekket smakssans, konsentrasjonsvansker, hyperrefleksi, slag, skjelving, forvirring, avhengighet, dysfori, emosjonell ustabilitet, eufori, svekket ytelse ved kognitiv testing, endret libido, nattlige skrekkanfall, obsessiv-kompulsiv atferd, panikktilstander, paranoia, rastløshet, nyreskade, impotens, svetting, hårtap, kretsløpssvikt, nummenhet, prikking og endret farge på fingre og tær når det er kaldt.